



# ПТИЦЫ ЯКУТИИ

## фотоальбом



Якутия – край суровой красоты, где обитает множество птиц. От берегов Ледовитого океана до таежных лесов пернатые радуют глаз.



Этот фотоальбом – путешествие в мир птиц Якутии.

Откройте для себя их разнообразие и великолепие!



## Желтоголовый королёк (*Regulus regulus*)



Это самый маленький представитель орнитофауны в Европе и России. Отличительная особенность этой птицы — яркая золотисто-жёлтая полоска на темени, «корона», благодаря которой птица приобрела своё научное и русское название. Держится в верхней части кроны деревьев и малозаметна с земли. Питается мелкими насекомыми, пауками, которых собирают, главным образом, на хвойных деревьях.





## Клёст-еловик (*Loxia curvirostra*)



Русское название клёст происходит от того, что клюв этой птицы по форме напоминает клещи – один из самых востребованных инструментов в кузнице. Верхняя часть клюва не прикрывает нижнюю, а загибается острым крючком вниз и в сторону. Нижняя же часть таким же крючком загибается вверх, но уже в противоположную сторону. Кстати, у одних птиц в правую, а у других в левую, т.е. среди этих птиц тоже есть «левши» и «правши».

Клесты питаются семенами хвойных, их органы и ткани пропитываются смолистыми веществами, поэтому птица после гибели не гниет, а усыхает - мумифицируется, поскольку «бальзамировалась» естественным путем в еще прижизненном состоянии.

А еще эти удивительные птицы могут не только выжить в сибирские морозы, но и вырастить потомство.







## Соловей - красношейка (*Calliope calliope*)

Это наш, северный соловей. Его песня громкая, почти не уступающая по звучности обыкновенному соловью, но короткая. У самца ярко-красное горло, белые «брови» и «усы», уздечка и полоска у подбородка и горла чёрные.

Питаются насекомыми и другими беспозвоночными, которых собирают почти исключительно на земле среди травы, кустов, подлеска, едят также ягоды.

Распространён в азиатской части России, включая Камчатку и Чукотский полуостров, кроме приполярных областей. Соловей-красношейка — перелётная птица. Зимует в Юго - восточной Азии, Южном Китае и Индии.

Гнездо на земле в виде шара находится на земле и хорошо замаскировано.







## Дрозд белобровик (*Turdus iliacus*)

Этот вид дроздов не боится холода, рано прилетает и поздно улетает с места гнездования.

Распространен в лесах и лесотундре от западных границ России до Байкала, Якутска и низовий Колымы.

Над глазами находятся беловато-жёлтые брови, отсюда – русское название этой птицы.

Питание белобровиков состоит, в основном, из насекомых и их личинок, дождевых червей.

Весной белобровики ведут себя спокойно. Сидя на маковке ели или на верхней веточке кроны, они пытаются привлечь самку своей громкой песней.





## Обыкновенный снегирь (*Pyrrhula pyrrhula*)



Латинское название снегирей — «pyrrhula», что означает ‘огненный’. У самцов снегирей грудка розовато-красного цвета, у самок — буровато-серого. Снегирь относится к преимущественно оседлым птицам, полностью откочевывает на зиму только из северной тайги. Питается семенами, почками и ягодами (в частности, рябиной). Кормясь ягодами, выедает из них семена, оставляя мякоть.

В дикой природе снегيري могут жить до 17 лет, но часто сильные холода и недостаток пищи сокращают их жизнь. Из-за неосторожности и плохой подвижности снегيري часто попадают в лапы хищников — куниц, ястребов, сов и даже кошек.

Почему снегирь зимняя птица? С наступлением холодов снегيري из лесов переселяются в парки и сады, ближе к местам проживания людей. На голых ветках деревьев, на фоне снега они становятся хорошо заметными своим ярким оперением, поэтому считаются зимними птицами. Весной, с появлением первой зелени, они пропадают из поля зрения людей. Среди густой зелени их редко замечают, поэтому многие ошибочно считают, что снегيري летом улетают куда-то далеко.





## Свиристель обыкновенный (*Bombycilla garrulus*)

Осенью и зимой стаи свиристелей появляются неизвестно откуда и начинают «прочёсывать» города, посёлки и деревни в поисках ягод. Они сметают всё — мелкие яблоки, боярышник, черемуху, не брезгают даже берёзовыми почками.

На красновато-коричневом оперении свиристелей выделяются жёлтые и белые сегменты на крыльях и жёлтая кайма на хвосте. Довольно красочный облик этой птицы довершают солидный хохол на голове и рыжее подхвостье. Самцы и самки внешне сходны.

С наступлением весны стаи свиристелей исчезают из людских поселений и растворяются в бескрайней северной тайге. В это время птицы разбиваются на пары, строят гнёзда, выводят потомство. Свиристели остаются малоизученными птицами, многое в их биологии ещё неизвестно.





## Большая синица (*Parus major*)



Размером с воробья, самая крупная синица в фауне России. У самца широкая черная полоса в нижней части тела, расширяющаяся на брюхе. А у самок тонкая черная полоса, может прерываться.

Большая синица широко распространена в лесах различного типа, парках и садах. встречается от Западной Европы до Дальнего Востока, от лесотундры на севере до тропиков Южной Азии.

Весной и летом питаются преимущественно насекомыми и их личинками. Ими же выкармливают птенцов. Осенью и зимой в рационе значительное место занимают семена и плоды растений. В отличие от большинства синиц корм не запасает, но активно пользуется чужими запасами. Очень частый гость кормушек.





## Ворон (*Corvus corax*)



Ворон — не самец вороны, как считают многие. Это два разных вида птиц из семейства Врановые. Ворон больше вороны и имеет более крупный клюв и характерную форму хвоста, который в полете напоминает клин.

Ворон — одна из немногих птиц, способных выполнять авиационные фигуры пилотажа: бочку и полубочку. Зимой ворон посещает обочины дорог, зверофермы, мясокомбинаты, свалки и места отдыха на природе, где кормится пищевыми отбросами или падалью.

Эта птица обладает одним из самых выдающихся интеллектов среди всех животных. Они способны использовать инструменты, общаться друг с другом, различать себя в зеркале, обладают пространственным мышлением, способны обманывать, а также очень мстительны. Но, при том, способны запоминать добро и по-своему благодарить.

Ворон распространён почти во всей Голарктике, местами проникает в тропические широты.

Пары создают на всю жизнь.





## Зяблик (*Fringilla coelebs*)



Зяблик широко распространен во всех типах лесов и является обычной перелетной птицей.

Это очень живая и подвижная птица, обращающая на себя внимание яркой окраской и звонкой неустойчивой песней. Поют самцы до середины июля, а потом умолкают до следующей весны.

Если к гнезду с яйцами или птенцами приблизится человек и дотронется до них, зяблики покидают на произвол судьбы и гнездо, и птенцов, которые неизбежно погибают. Это всегда надо иметь в виду и не беспокоить птиц.

Зяблики приносят пользу тем, что питаются и выкармливают птенцов различными вредными насекомыми (долгоносиками, щелкунами, листоедами, гусеницами и яйцами вредных бабочек, а также едят семена сорных трав).

Благодаря прекрасному пению зяблик считается певчей птицей, поэтому любители содержат зябликов в клетках. В неволе зяблик никогда не становится вполне ручным и несомненно начинает петь, хотя живет довольно долго (до 12 лет).





## Чечевица обыкновенная (*Carpodacus erythrinus*)



Чечевицу, или красного воробья, можно узнать по характерным звукам, напоминающим фразы: «Витю видел? Витю видел ты?». Красный окрас проявляется у самцов лишь на второй год. Мощный клюв чечевицы говорит о том, что птица питается семенами, почками и плодами растений. Птенцов эти птицы также выкармливают семенами, хотя, в рационе есть и насекомые. Гнездится в лесной зоне Евразии. Зимовки находятся в Южной и Юго-Восточной Азии.

Населяет открытые пространства с зарослями кустарников, опушки лесов, поймы рек. На глаза попадает редко, так как прячется в густой листве, поэтому выдает своё присутствие характерной песней.

Чечевицы рано улетают на зимовку — в середине августа.

Происходит это потому, что чечевицы из европейской части летят сначала на восток и только долетев до Сибири, сворачивают на юг. По этой же причине и прилетают они довольно поздно — в мае.





Свиристель  
обыкновенный  
(*Bombycilla  
garrulus*)





Обыкновенный  
снегирь  
(*Pyrrhula pyrrhula*)







**Дрозд белобровик**  
*(Turdus iliacus)*





# Соловей – красношейка (Calliоре calliоре)





**Зяблик**  
**(*Fringilla coelebs*)**





**Чечевица  
обыкновенная  
(*Carpodacus  
erythrinus*)**







**Желтоголовый королёк**  
*(Regulus regulus)*

